

海外旅行用ワクチン 2016 年 7 月現在

病名・ワクチン名	回数	間隔	予防効果 発現時期	有効期間	その他
黄熱病 YellowFever [Stamaril] (生) シティのみ接種可	1回		10 日後	一生	卵アレルギーのある人は接種できない 生後 9 ヶ月から接種可能 接種後 1 ヶ月は他の生ワクチンは 接種できない
狂犬病 Rabies [Rabies Vaccine] [Rabipur] (不活化)	3回	0-7-28(21)日			
A型肝炎 HepatitisA [Havrix Monodose] (不活化)	1回		2-4 週後	1 年以上	6-12 ヶ月以内に追加接種すれば、その 後の追加接種は必要でない。 16 歳から接種可能 1-15 歳は Havrix Junior Monodose を使用
B型肝炎 HepatitisB [EngerixB] (不活化)	3回	0-1-6 ヶ月 0-1-2(-12)ヶ月 0-7-21 日(-12 ヶ月)			
腸チフス Typhoid [Typhim Vi] (不活化)	1回		2 週後	3 年	2 歳より接種可能
髄膜炎 Meningitis [Menveo] (meningococcal A+C+W135+Y) (不活化)	1回		1 ヶ月後		2 歳から接種可能
破傷風 Tetanus [Revaxis](dT/IPV) (不活化)	3回	1 ヶ月	3 回目の接種後	5 年	4 回目の接種より 10 年後に追加接種
ポリオ Polio [Revaxis](dT/IPV) (不活化)	3回	1 ヶ月	3 回目の接種後	5 年	4 回目の接種より 10 年後に追加接種
ジフテリア Diphtheria [Revaxis](dT/IPV) (不活化)	3回	1 ヶ月	3 回目の接種後	5 年	4 回目の接種より 10 年後に追加接種 10 歳以上は低用量のものをを用いること
コレラ Cholera [Dukoral] (不活化)		1 週間以上 6 週未満	最後の接種より 1 週後		1 回目と 2 回目、2 回目と 3 回目の間隔が 6 週以上、最終の接種から 2 年以上経った 場合は、初回からやり直し。 前後 1 時間は絶飲食。
	2 回	6 歳～成人		2 年	
	3 回	2～5 歳		6 ヶ月	
日本脳炎 Japanese Encephalitis [IXIARO] (不活化)	2 回	28 日	2 回目の接種より 1 週間後	1-2 年	生後 2 ヶ月以上
ダニ脳炎 Tick- Borne Encephalitis [TicoVac] (不活化)	3 回	0-(1-3)ヶ月-2 回目から 数えて(5-12)ヶ月 早く抗体をつけたい場合 は 2 回目を 2 週間 後に接種		3 年(追加 接種後は 5 年)	16 歳以上 1-15 歳は TickVac Junior を使用